

Noiembrie 2018

**NeoRecormon (epoetină beta) - soluție injectabilă în seringă preumplută****Informații referitoare la modificarea conținutului din ambalaj**

**Stimate profesionist din domeniul sănătății,**

De comun acord cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), compania farmaceutică F. Hoffmann-La Roche Ltd. (denumită în continuare Roche), prin reprezentanța sa locală Roche România S.R.L., dorește să vă informeze cu privire la următoarele aspecte:



**Rezumat**

- În Europa, Roche va introduce o nouă prezentare pentru NeoRecormon (epoetină beta) soluție injectabilă în seringă preumplută, care va conține și un sistem de siguranță pentru ac, pentru ambalajele care conțin 1, 4 sau 6 seringi preumplute.

**Informații suplimentare referitoare la conținutul ambalajului**

Roche va introduce o nouă prezentare pentru NeoRecormon (epoetină beta) soluție injectabilă în seringă preumplută, prin includerea în ambalaj a sistemului de siguranță pentru ac, în concordanță cu Directiva Uniunii Europene (2010/32/EU) pentru prevenirea întepăririile accidentale. Noua configurație a ambalajelor de NeoRecormon (epoetină beta) soluție injectabilă în seringă preumplută va conține un sistem de siguranță pentru ac (Terumo SurGuard 3).

Astfel, se va modifica configurația ambalajului care, nu va mai conține seringă preumplută/seringile preumplete și acele în blister, ci va conține în ambalaj o casetă separată cu numărul corespunzător de ace SurGuard împachetate și așezate în partea de sus a seringilor. Această nouă configurație este aplicabilă pentru ambalajele care conțin 1, 4 sau 6 seringi preumplute.



Instrucțiunile actualizate privind utilizarea acestui sistem activ de siguranță pentru ac fac parte din Rezumatul caracteristicilor produsului NeoRecormon (epoetină beta) („NeoRecormon seringă preumplută, Instrucțiuni pentru utilizare”) și sunt publicate pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). O copie a acestor instrucțiuni actualizate este anexată acestei comunicări.

***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului NeoRecormon (epoetină beta), către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Raportează o reacție adversă.

***Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale***

Str. Aviator-Sănătescu nr. 48, sector 1,

București 011478- RO, România

Fax: +4 0213 163 497

E-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP), la următoarele date de contact:

***ROCHE ROMÂNIA S.R.L.***

Piața Presei Libere, Nr. 3-5

Clădirea City Gate – Turnul de Sud

Departamentul Medical, etaj 6, Sector 1

013702 - București, România

Departament Farmacovigilență:

Tel: +4021 206 47 48

Fax: +4037 200 32 90

e-mail: [romania.drug\\_safety@roche.com](mailto:romania.drug_safety@roche.com)

***Coordonatele de contact ale reprezentanței locale ale Deținătorului de autorizație de punere pe piață***

Pentru întrebări și informații suplimentare referitoare la utilizarea medicamentului NeoRecormon (epoetină beta), vă rugăm să contactați Departamentul Medical al Companiei ROCHE ROMÂNIA S.R.L.:

Dr. Carmen Motoc,

Group Medical Manager

ROCHE ROMÂNIA S.R.L.

Piața Presei Libere, Nr. 3-5

Clădirea City Gate – Turnul de Sud

Departamentul Medical, etaj 6, Sector 1

013702 - București, România

Recepție: +4021 206 47 01/02/03

Fax: +4037 200 32 90

e-mail: [romania.medinfo@roche.com](mailto:romania.medinfo@roche.com)

Cu stimă,

Dr. Marius Ursă

Director Medical

Roche România S.R.L.

## NeoRecormon seringă preumplută

### Instrucțiuni pentru utilizare

Următoarele instrucțiuni explică cum se administrează injecția de NeoRecormon. Asigurați-vă că citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile de utilizare cât și prospectul, înainte de a administra NeoRecormon. Medicul dumneavoastră trebuie să vă arate cum să preparați și să injectați NeoRecormon în mod corespunzător înainte de a utiliza acest medicament pentru prima dată. Nu vă injectați NeoRecormon decât dacă ați fost instruit. Consultați-vă medicul dacă aveți nevoie de instrucțiuni suplimentare. NeoRecormon poate fi administrat în 2 moduri, iar medicul dumneavoastră va decide care este varianta potrivită pentru dumneavoastră.

- Administrare intravenoasă (într-o din vene sau printr-un port injector), care trebuie efectuată numai de către un profesionist din domeniul sănătății.
- Administrare subcutanată (sub piele).

#### **Înainte să începeți**

- Nu scoateți capacul de protecție al acului până când nu sunteți gata să injectați NeoRecormon.
- Nu încercați să dezmembrați seringa, sub nicio formă.
- Nu reutilizați aceeași seringă.
- Nu utilizați dacă ați scăpat seringa pe jos sau este deteriorată.
- Nu lăsați seringa nesupravegheată.
- Nu lăsați seringa, acul și recipientul rezistent la perforare sau recipientul pentru obiecte ascuțite la îndemâna copiilor.
- Dacă dacă aveți întrebări, contactați-l pe medicul dumneavoastră.


#### **Instrucțiuni de păstrare**

- Păstrați seringa (seringile) nefolosite în cutia originală, în frigider, la temperaturi între 2°C și 8°C.
- Nu lăsați seringa de NeoRecormon în lumina directă a soarelui.
- Nu congelați.
- Nu utilizați dacă seringa a fost congelată.
- Păstrați întotdeauna seringa uscată.


#### **Materiale necesare pentru administrarea injecției**

##### **Incluse în cutie:**

- NeoRecormon seringă(i) preumplută(e).



- Ac(e) 27G sau 30G cu capac de protecție (utilizate pentru pregătirea, ajustarea dozei și injectarea medicamentului).



### Capac de protecție al acului

**Notă:** Fiecare cutie cu NeoRecormon conține 1 seringă/1 ac, 4 seringi/4 ace sau 6 seringi/6 ace.


- Instrucțiuni de utilizare și prospect.

**Nu sunt incluse în cutie:**

- 1 tampon cu alcool medicinal.
- 1 tampon steril.
- 1 recipient rezistent la perforare sau recipient pentru obiecte ascuțite pentru îndepărțarea în siguranță a capacului din cauciuc, a capacului de protecție al acului și a seringii folosite.

### Pregătirea pentru administrarea injecției


- 1 Găsiți o suprafață de lucru bine luminată, curată și plană.  
• Scoateți cutia care conține seringa (seringile) și acul (acele) din frigider.
- 2 Verificați dacă cutia este deteriorată și verificați dacă data de expirare inscrisă pe cutie este depășită.  
• Nu utilizați dacă data expirare este depășită, dacă seringa a fost scăpată pe jos sau este deteriorată sau dacă pare afectat. Dacă observați aceste lucruri, continuați cu punctul 19 și contactați-l pe medicul dumneavoastră.
- 3 Scoateți o seringă din cutie și un ac din cutia cu ace. Aveți grijă când scoateți seringa. Asigurați-vă că țineți întotdeauna seringa așa cum apare în figura de mai jos.  
• Nu întoarceți cutia pentru a scoate seringa.  
• Nu apucați seringa de piston sau de capacul de protecție al acului.  
**Notă:** Dacă aveți un ambalaj multiplu, puneți cutia cu celelelate seringi și ace rămase în frigider.




- 4 Inspectați cu atenție seringa și acul  
• Verificați seringa și acul pentru orice deteriorare. Nu utilizați seringa dacă ați scăpat-o sau dacă orice component a acesteia pare deteriorată.

- Verificați data de expirare de pe seringă și ac. Nu utilizați seringă sau acul dacă data de expirare este depășită.
  - Verificați lichidul din seringă. Lichidul din seringă trebuie să fie lîmpedă și incolor. Nu utilizați seringă dacă lichidul este tulbure, decolorat sau conține particule.
- 5 Așezați seringă pe o suprafață curată, plană.
- Lăsați seringă să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. În acest timp, lăsați capacul de protecție al acului pe poziție.
  - Nu grăbiți acest proces prin nicio metodă și nu puneți seringă în cuptorul cu microondă și nici nu încălziți în apă caldă.

*Notă: Dacă nu lăsați seringă să ajungă la temperatura camerei, este posibil să prezentați o senzație de disconfort la administrarea injecției și să întâmpinați dificultăți la apăsarea pistonului.*




- 6 Atașați acul la seringă.
- Îndepărtați acul din ambalaj.
  - Scoateți capacul din cauciuc (A).
  - Aruncați imediat capacul din cauciuc într-un recipient rezistent la perforare sau într-un recipient pentru obiecte ascuțite.
  - Nu atingeți capătul seringii.
  - Nu apăsați sau trageți pistonul.
  - Tineți seringă de corpul acesta și apăsați acul spre seringă (B).
  - Rotiți ușor până când este atașat complet (C).




Capac din cauciuc

A)



B)




C)

7 Așezați seringa pe o suprafață curată, plană, până când sunteți gata de injectare.

8 Spălați-vă mâinile cu apă și săpun.

9 Alegeti un loc de injectare:

- Locurile de injectare recomandate sunt pe partea superioară a copasei sau pe partea inferioară a abdomenului, sub omblig (buric). Nu injectați în zona circulară de 5 centimetri din jurul ombligului.
- Alegeti un loc diferit de injectare pentru fiecare nouă injecție.
- Nu injectați în alunițe, cicatrici, vânătăi sau zone în care pielea este sensibilă, roșie, întărăită sau nu este intactă.
- Nu injectați în venă sau în mușchi.




10 Stergeți locul injectării cu un tampon cu alcool medicinal și lăsați să se usuce timp de 10 secunde.

- Nu ventilați sau suflați asupra zonei curățate.
- Nu atingeți zona de injectare înainte de a vi se administra injecția.



#### Administrarea injecției subcutanate


11 Îndepărtați sistemul de siguranță de ac, în direcția corpului seringii.




12 Țineți seringa și acul ferm și trageți cu atenție capacul de protecție al acului. Utilizați seringa în curs de 5 minute de la îndepărarea capacului; altfel, acul se poate bloca.

- Nu apăsați pistonul în timp ce îndepărtați capacul de protecție al acului.
- Nu atingeți acul după ce ați îndepărtat capacul de protecție al acului.
- Nu reatașați capacul de protecție al acului.


Aruncați imediat capacul de protecție al acului într-un recipient pentru obiecte ascuțite.



13 Țineți seringa cu acul îndreptat în sus. Îndepărtați bulele de aer de dimensiuni mari prin lovirea ușoară, cu degetele, a corpului seringii, până când bulele de aer ajung la partea superioară a seringii. Apoi, apăsați ușor pistonul pentru a împinge bulele de aer în afara seringii.




14 Ajustați până la doza prescrisă prin împingerea ușoară a pistonului.




15 Prindeți o porțiune de piele de la locul de injectare ales și introduceți acul, pe toată lungimea sa, sub un unghiu între 45° și 90°, cu o mișcare fermă, rapidă.

- Nu atingeți pistonul în timp ce introduceți acul în piele.
  - Nu introduceți acul prin îmbrăcăminte.
- Odată ce acul este introdus, dați drumul pliului de piele format și țineți seringa ferm, în aceeași poziție.



- 16 Injectați încet doza prescrisă prin apăsarea ușoară, până la capăt, a pistonului**
- Îndepărtați acul, împreună cu seringa, de la locul de injectare, în același unghi în care l-ați introdus.



#### După injectare

- 17 Este posibil să apară sângerare la locul de injectare. Țineți apăsat ușor un tampon steril uscat, la locul injectării. Nu masați locul de injectare.**


- Dacă este necesar, puteți acoperi locul injectării cu un mic pănsament.

- În cazul în care pielea intră în contact cu medicamentul, spălați zona respectivă cu apă.


- 18 Îndepărtați sistemul de siguranță, sub un unghi de 90°, de corpul seringii (A).**  
Țineți seringa cu o mână, apăsați sistemul de siguranță în jos, spre o suprafață plană, cu o mișcare rapidă, fermă, până auziți un sunet de "clic" (B).

- Dacă nu auziți un sunet de "clic", verificați dacă acul este acoperit complet de sistemul de siguranță.

- Țineți întotdeauna degetele în spatele sistemului de siguranță și departe de ac.



A)



B)

19 Puneți seringa într-un recipient pentru obiecte ascuțite imediat după utilizare.

- Nu încercați să îndepărtați acul folosit de pe seringa folosită.
- Nu reatașați capacul de protecție al acului.
- Nu aruncați seringa în gunoiul menajer.

**Important:** Nu lăsați recipientele pentru obiecte ascuțite la îndemâna copiilor.

**Instrucțiuni pentru administrare destinate doar profesioniștilor din domeniul sănătății**

Următoarele instrucțiuni sunt destinate doar profesioniștilor din domeniul sănătății:

Următoarele instrucțiuni explică cum se administrează injecția de NeoRecormon. Asigurați-vă că citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile de utilizare cât și prospectul, înainte de a administra NeoRecormon.

**Administrarea injecției intravenoase**

Pregătirea pentru administrarea injecției: urmați punctele 1 până la 8

**9 Alegeți o venă.** Schimbați venă la fiecare administrare pentru a preveni apariția durerii într-un singur loc.

• Nu injectați într-o zonă înroșită sau cu umflături.

• Nu injectați într-un mușchi.

Ștergeți pielea de deaspura venei cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal și lăsați să se usucă.

• Nu ventilați sau suflați asupra zonei curățate.

• Nu atingeți zona de injectare înainte de a vi se administra injecția.

**10 Pregătiți seringa și acul;** urmați punctele 11 până la 14.

**15 Introduceți acul în venă.**

• Nu țineți sau apăsați pistonul în timp ce introduceți acul.

**16 Injectați încet doza prescrisă prin apăsarea ușoară, până la capăt, a pistonului.** Îndepărtați acul, împreună cu seringa, de la locul de injectare, în același unghi în care l-ați introdus.

După injectare, urmați punctele 17 până la 19.

**Administrarea intravenoasă a injecției printr-un port injector**

Pregătirea pentru administrarea injecției: urmați punctul 1 până la 8.

**9 Stergeți pielea de deasupra portului injector cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal și lăsați să se usuce.**

Curățați portul injector conform instrucțiunilor furnizorului.

• Nu ventilați sau suflați asupra zonei curățate.

• Nu atingeți zona de injectare înainte de a vi se administra injecția.

**10 Pregătiți seringa și acul;** urmați punctele 11 până la 14.

**15 Introduceți acul în portul injector (urmați instrucțiunile furnizorului portului injector)**

• Nu țineți sau apăsați pistonul în timp ce introduceți acul.

**16 Injectați încet doza prescrisă prin apăsarea ușoară, până la capăt, a pistonului.** Îndepărtați acul, împreună cu seringa, de la locul de injectare, în același unghi în care l-ați introdus.

După injectare, urmați punctele 17 până la 19.