

29.IUL.2016

Marinela

ANUL	LUNA	ZIUA
INREGISTRAT NR. 21439		
A JUDETULUI BRAILA		
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE		

Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății

Formele farmaceutice de comprimate și suspensie orală ale medicamentului NOXAFILE (posaconazol) nu sunt interschimbabile

Stimulate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, compania Merck Sharp & Dohme Limited (MSD), prin reprezentanța din România, dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat

- Formele farmaceutice de comprimate și suspensie orală ale medicamentului NOXAFILE (posaconazol) nu sunt interschimbabile
- Înlocuirea comprimatoarelor cu suspensia orală sau invers poate duce la supradozare sau subdozare, precum și la riscul apariției reacțiilor adverse grave sau lipsă de eficacitate
- Medicii prescriptori trebuie să specifice forma farmaceutică pe fiecare prescripție medicală pentru posaconazol, iar farmaciștii trebuie să se asigure de eliberarea corectă a formei farmaceutice cu administrare orală.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță și recomandările respective

Posaconazolul este un medicament antifungic cu spectru larg, din clasa derivaților de triazol, indicat pentru utilizarea în tratamentul infecțiilor fungice și profilaxia infecțiilor fungice sistemică.

Posaconazolul este disponibil sub formă de suspensie orală (40 mg/ml), comprimate (100 mg) și concentrat pentru soluție perfuzabilă (300 mg). Doza de posaconazol recomandată pentru administrarea pe cale orală este:

Comprimat: 300 mg/zi (ulterior unei doze de încărcare de 600 mg în primul zi)

Suspensie orală: 600-800 mg/zi.

Au fost raportate erori de medicație ca urmare a substituției celor două forme farmaceutice de comprimat și suspensie orală ale medicamentului Noxafile. Trecerea inadecvată de la

administrarea de soluție orală în administrarea de comprimate a determinat apariția de cauză de toxicitate legată de doză, în timp ce trecerea de la administrarea de comprimate la administrarea de soluție orală a determinat subdozare și lipsă de eficacitate. Rezumatul caracteristicilor produsului și prospectul pentru posaconazol sunt în curs de actualizare în vederea includerii atenționării referitoare la faptul că forma farmaceutică de comprimat nu poate fi înlocuită în mod direct cu suspensia orală sau invers. Ambalajele secundare pentru formele de prezentație cu administrare orală din UI sunt în curs de revizuire pentru a se diferenția mai clar cele două forme farmaceutice și vor include o atenționare cu privire la faptul acestea că nu sunt interechimabile.

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Este important să raportezi apariția oricărora reacții adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului **Noxfil 100 mg comprimate (posaconazol)** și **Noxfil 40 mg/ml suspensie orală (posaconazol)**, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul "Fișei pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente" disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secția Medicamente și azumini/Raportenă o reacție adversă, trimisă către:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48,
Sector 1, 011478 - București, România
Tel: +4 0757 117 259
Fax: +40 213 163 497
E-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacțiile adverse se pot raporta și către reprezentanța din România a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Merek Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Bucharest Business Park,
Șoseaua București-Ploiești, Nr. 1A, corp C1, etaj 3, Sector 1,
București, România.
Tel: +4 021 529 29 00, Fax: +4 021 318 52 36
e-mail: dpcrromania@merek.com.

Această comunicare nu se dorește să fie o descriere completă a beneficiilor și riscurilor asociate cu utilizarea medicamentului **Noxfil**. Pentru recomandări complete de prescriere ale medicamentului Noxfil, vă rugăm să consultați Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP).

Coordonatele de contact ale reprezentanței locale a deținătorului de autorizație de punere pe piață

Reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Merek Sharp & Dolme Romania S.R.L.

Bucharest Business Park,

Șoseaua București-Ploiești, Nr. 1A, corp C1, etaj 3, Sector 1,
București, România.

Tel: +4 021 529 29 00, Fax: +4 021 318 52 36

e-mail: dpcr.romania@merek.com.

Cu stima,

Dr. Costin Tunca
Director Medical MSD Romania