

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Decembrie 2020

Metamizol: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață (DAPP) pentru medicamentele care conțin metamizol, de comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat

- Au fost raportate cazuri de leziuni hepatice induse medicamentos (drug-induced liver injury – DILI), asociate cu administrarea de metamizol.
- Vă rugăm să instruiți pacienții cu privire la următoarele aspecte:
 - cum să recunoască simptomele precoce sugestive pentru leziuni hepatice induse medicamentos,
 - să opreasă utilizarea de metamizol în cazul apariției acestor simptome și să solicite asistență medicală pentru evaluarea și monitorizarea funcției hepatice.
- Administrarea de metamizol nu trebuie reluată la pacienții care au prezentat un episod de leziune hepatică în timpul tratamentului cu metamizol, în situația în care la acești pacienți nu s-a identificat nicio altă cauză pentru apariția leziunii hepatice.

Informațiile de siguranță conținute la punctele 4.4. ("Atenționări și precauții speciale pentru utilizare") și 4.8. ("Reacții adverse") din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP), precum și cele din Prospect vor fi actualizate în consecință.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță

Metamizol este un derivat de pirazonă non-opioid cu proprietăți analgezice și antipiretice puternice și proprietăți antiinflamatorii slabe, "care este indicat de la vârsta de 3 luni la pacienții cu greutatea de cel puțin 5 kg pentru tratamentul durerii și febrei severe sau rezistente". [A se vedea Anexa 1 pentru indicațiile terapeutice aprobate la nivel național pentru fiecare DAPP care comercializează metamizol în România].

Metamizol este disponibil, de asemenea, și sub formă de combinații în doză fixă [A se vedea Anexa 1 pentru combinațiile în doză fixă cu metamizol, precum și pentru indicațiile terapeutice aprobate la nivel național ale acestora].

Informațiile noi identificate recent privind leziunile hepatice au determinat o revizuire completă a datelor asociate cu potențialul metamizolului de a determina DILI. În timpul revizuirii, Comitetul EMA pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilanță (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC) a luat în considerare informațiile din toate sursele disponibile, inclusiv rapoartele de reacții adverse la medicamente și studiile publicate în literatura științifică.

S-a observat că leziunile hepatice sunt predominant de tip hepatocelular, cu debut de la câteva zile până la câteva luni de la inițierea tratamentului. Semnele și simptomele au inclus niveluri crescute ale enzimelor hepatice, asociate sau nu cu icter, frecvent în contextul altor reacții de hipersensibilitate la medicamente (de exemplu, erupții cutanate tranzitorii, discrazi sangvine, febră și eozinofilie) sau însușite de caracteristici ale hepatitei autoimune. La unii pacienți, leziunile hepatice au reapărut la reluarea administrării.

Mecanismul leziunilor hepatice induse de metamizol nu este pe deplin cunoscut, dar datele disponibile indică un mecanism imunoalergic.

În general, leziunile hepatice induse medicamentos pot evoluă către forme potențial grave, cum este insuficiența hepatică acută care necesită transplant hepatic.

Pe baza experienței cumulative cu metamizol, de după punerea pe piață a acestuia, experiență de aproape 100 ani, precum și pe baza gradului de expunere a pacienților la acest medicament, apariția leziunilor hepatice cauzate de metamizol este considerată a fi foarte rară, dar frecvența exactă nu poate fi calculată.

Este esențială recunoașterea precoce a leziunilor hepatice potențiale determinate de utilizarea metamizolului. Pacienților trebuie să li se recomande să fie vigilanți în ceea ce privește apariția simptomelor de leziuni hepatice potențiale și să fie încurajați să oprească utilizarea metamizolului și să se adreseze unui medic în cazul în care apar astfel de simptome. Profesioniștii din domeniul

sănătății sunt sfătuți să evalueze și să monitorizeze funcția hepatică la pacienții care se prezintă cu semne și simptome care sugerează orice leziune hepatică.

Reexpunerea la metamizol nu este recomandată în cazul unui episod anterior de leziune hepatică apărut în timpul tratamentului cu metamizol, leziune hepatică pentru care nu a fost determinată nicio altă cauză.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea de metamizol, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO, România

Fax: +4 0213 163 497

E-mail: adr@anm.ro

www.anm.ro

Raportare online la link-ul următor: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.

Anexe

Anexa 1 - Cordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață care comercializează metamizol în România

Anexa 1 - Coordonate de contact ale reprezentanților locale ale Deltătorilor de Autorizație de Punere pe Piață care comercializează medicamente în România

Destinatarul autorizației de punere pe piață	Denumirea produs, concentrație și formă farmaceutică	DCI	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentanța locală	Nume reprezentant Deltător autorizat de către cea de pe DPL
SOPHARMA AD, Bulgaria	Mitamadol sodiu FWL 500 mg/ml soluție injectabilă	METAMIZOLUM Natrium	Injecție Intramusculară sau Intravenosă lentă	Acest medicament este indicat la adulți și adolescenți cu vârstă de peste 15 ani pentru ameliorarea pațimii scurte a dureroi acute severe de diverse etiologii, cum ar fi: - dureri severe de origine tumorala; - dureri severe acutice sau cronice, atunci când sunt contraindicate terapiele sunt contraindicate: Ca agent antiprelucrator al tratamentului complex al differitelor afecțiuni, însoțit de febră, care nu răspunde la alte terapii. Administrația parenterală este indicată numai atunci când administrația orală nu este o alternativă.	farmasocofiditient@pharmasocofiditient.com, pharmacoefiditient@pharmacoefiditient.com	+40748155240	NA	Pharma Euroconsult SRL, Str. Conta Nr.8A, Bl. A3/2, Sc.A, Ap.4, Et.1, Sector 3, București Cod postal 032731, Telefon: 0748189240, Email: E.georgescu@pharmaeuroconsult.com	Gabriel Georgescu
ANTIBOTIC SA, ROMÂNIA	NOVOCALMIN 500 mg comprimate	METAMIZOLUM Natrium	Orală	Dureri acutice severe postoperatorice sau postoperatorice colici; dureri de cauză tumorali; altele dureri severe acut sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combarerea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament	mihaiela.monea@antibotic.ro, cristina.catalin@antibotic.ro, siemensdame@antibotic.ro	+40720531164 +40232205000 +40372055200	+409372055633	Ambițiose SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași Tel.: +40 232 205 000; +40 372 055 000 Fax: +40 232 205 633	Dr. Mihaela Moneagu
ANTIBOTIC SA, ROMÂNIA	NOVOCALMIN 300 mg supușcăre	METAMIZOLUM Natrium	Recală	Dureri severe postoperatorice sau postoperatorice colici; dureri de cauză tumorali; altele dureri severe acut sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combarerea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	mihaiela.monea@antibotic.ro, cristina.catalin@antibotic.ro, siemensdame@antibotic.ro	+40720531164 +40232205000 +40372055200	+409372055633	Ambițiose SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași Tel.: +40 232 205 000; +40 372 055 000 Fax: +40 232 205 633	Dr. Mihaela Moneagu
COMBINATII: TRAFEN 500 mg, 0,1 mg, 0,3 mg, compriimate	metamisol hidratat, clorhidrat de pirofen, bromonistat de fenilpirimidină		Orală	Tratamentul durerilor moderate (cefalee, dureri dentare, colică bilare și rene, cistite, dismenore, dureri postoperatorii și posttraumatice)	mihaiela.monea@antibotic.ro, cristina.catalin@antibotic.ro, siemensdame@antibotic.ro	+40720531164 +40232205000 +40372055200	+409372055633	Ambițiose SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași Tel.: +40 232 205 000; +40 372 055 000 Fax: +40 232 205 633	Dr. Mihaela Moneagu
SANTA S.A.	ALGIDOP 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM Natrium	Oral	Dureri acutice severe postoperatorice sau postoperatorice colici; dureri de cauză tumorali; altele dureri severe acut sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combarerea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament	sorana.mariinde@cantapharm.ro, farmacosocial@cantapharm.ro, mardoc.santa@cantapharm.ro	+403684010927; +403716125999	+403684010923	S.C. SANTA S.A., Sir Capătitor, nr. B3, B5, apăju comunită Vărsătier comunită, București nr. 1, Brăilei, Județul Brăila, cod 500259, România; Tel.: +40 368 401 092 Fax: +40 368 401 093	Dr. Nandor Santa

Anexa 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Delegațiilor de Autoritate de Punere pe Plată care comităsează metionizat în formata

Denumirea Delegaților autonome și de punere pe plată	Produs, concentrat și formă farmaceutică	DQ	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentanță locală	Nume reprezentant Delegație autorizată de punere pe plată
FARMACOM SA METAMIZOL 500 mg, comprimat	METAMIZOL NATRUM	Oraș		Dureri acute severe, persistente sau postoperatorii; colici durere de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când sunt provocate de rupții de articulații. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	office@farmacom.ro	+40 261 331 114	+40 268 230 864	Farmacom S.A. Strada Zlătiniș nr.112, Sighetu Marmatiei, România Tel: 0268.331.114, Fax: 0268.330.864 e-mail: office@farmacom.ro	Reta Balas
LAROPHARM S.R.L.	AUDOR 500 mg, comprimat	METAMIZOL NATRUM	Oraș	- Dureri acute severe, persistente sau postoperatorii, colici, durere de cauză tumorali, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când sunt provocate de rupții de articulații. - Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	farmaco@laropharm.ro	+40 021 369 31 02	+40 021 369 32 06	S.C. Laropharm S.R.L. Adresa: Soseaia Alexandriei, nr. 145A, Brașov, 077025, Ilieu, România Tel: +40 749 406 039; +40 734 222 362 E-mail: farmaco@laropharm.ro Reprezentant: Stani Raluca Pharmacist Responsabil Medical & Pharmacovigilance Tel: +40 734 222 982 Email: raluca.stani@laropharm.ro	Farm. Raluca Stani
ALGOCALMIN 500 mg, comprimat	METAMIZOL NATRUM	Oraș		Dureri acute severe persistente sau postoperatorii; colici, durere de cauză tumorali, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când sunt provocate de rupții de articulații. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	zolivar@zolivita.com	+40 021 504 7597	+40 21 345 4004	Zentiva SA Romania Str. Theodore Pallady, nr. 50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentivato@zentiva.com Ileana.Nicol@zentiva.com	Ileana Nicol Uliana Gherghe
ALGOCALMIN 1 g/ml, soluție injectabilă	METAMIZOL NATRUM	Injecție intramusculară sau intravenoasă lentă		Injectie intramusculară sau intravenoasă lentă	zentivito@zentiva.com	+40 021 304 7597	+40 21 345 4004	Zentiva SA Romania Str. Theodore Pallady, nr. 50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentivito@zentiva.com Ileana.Nicol@zentiva.com	Ileana Nicol Uliana Gherghe
ZENTIVA S.A.	COMBINATIE: metamizol hidratat de polifenoli soluție injectabilă	1 g/ml		Înjecție intramusculară prin fund sau intravenoasă	zentivito@zentiva.com	+40 021 304 7597	+40 21 345 4004	Zentiva SA Romania Str. Theodore Pallady, nr. 50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentivito@zentiva.com Ileana.Nicol@zentiva.com	Ileana Nicol Uliana Gherghe

Anexa 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Dilectorilor de Autorități de Punere pe Piață care comercializă nelemtiu în România

Dilectorul autoritatii de punere pe piata	Codnumele produs, concentrație și formă farmaceutică	DI	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentanță Locală	Nume reprezentant/ deținător autoritatii de punere pe piata
AEGIFEN 500 mg/5 ml/0,1 ml, comprimate	COMBINATII: metamizol cu, clorhidrat de plășterna, bromuri de temporană	Orală		Tratamentul simptomatic al sindromelor aligice înjucțile de spasm ale muscularului este, colică renală, disfuncții hepatobiliare, pancreatită cronică, constipație, constipare, dimenor. De asemenea, este recomandată în tratamentul dureroilor postoperatoriale și posttraumatice, în calee, mărgine, odontalgii.	itsupplyro@zenitha.com	+40 021 304 7597 021 345 4004	(+40) 021 318 0276	Zemita SA, București, str. Nicolae Pallady, nr. 50, București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 305 4004 e-mail: zenithro@zenitha.com Ileana Niclaș	Ileana Niclaș
ALGOZONE 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM Natrium	Orală		Dureri acute severe postoperatoriale sau posttraumatice; colici; durerile de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combarerea febrilă, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	info@romania@zenitha.com	+40 021 318 0277 021 318 0276	(+40) 021 318 0276	S.C. ZEMITA S.R.L., București, Sector 3 Tel: +40 021 318 0377 Fax: +40 021 318 0376 e-mail: info@romania@zenitha.com Ileana Niclaș	Ileana Niclaș
STADA ARZNEIMITTEL AG	LODAGIN 500 mg/ml, picături orale, soluție	METAMIZOLUM Natrium	Orală	Dureri acute sau cronică, constipație, colică, dureri de origine tumorală, alte dureri severe, acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice sunt contraindicate; febră mare, căci nu răspunde la alte mijloace terapeutice	info@romania@zeta.ro	+40 21 316 06 00 020 744 560 328 +49 751 119 156	(+40) 021 326 05 38	Adresa: Str. St. Elefterie, nr. 10, București, Et. 1, Sector 5, București, România Tel: +40 744 560 328 +40 751 219 156 e-mail: antonela.mazatu@romofarm.com rigore.loneascu@zeta.ro Dr. Antonela Mazatu	Antonela Mazatu
SANOFI ROMANIA S.A.	QUARELIN 400mg/50mg/40 mg, comprimate	COMBINATII: metamizol cu, clorhidrat de drozaverină	Orală	Cefaleea severă sau rezistentă, fară înjări și ascuțitor migrenosă, upoare și moderate	021 317 31 36	+40 21 317 31 34	Sanofi Romania SRL, Str. Gura Herăstrău nr. 4, Cladirea B, etajul 6, Sector 2, București, România Tel: +40 (0)21 317 31 36 Fax: +40 (0)21 317 31 34 e-mail: proxo@sanofi.com monica.ziaru@sanofi.com	Dr. Loredana Petru	
TTS FARMACEUTIC S.A.	TRISALAIN 200 mg, suplimentare	METAMIZOLUM Natrium	Recală	Dureri acute severe postoperatoriale sau posttraumatice; colici; durerile de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combarerea febrilă, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	farmaceuttis@farmaceuttis.ro	+40 212 250 0390	+40 212 56 30 88	TTS FARMACEUTIC S.A., Str. Indiferitorilor nr. 15, sector 3, București, România E-mail: ofice@ttsfarmaceutic.ro Tel/Fax: +40 21 255 30 88	Farm. Ana Orfim
AS KALCEKS	Metamizol 500 mg/mi soluție injectabilă	METAMIZOLUM Natrium	Intravenosă, Intramusculară	Dureri acute severe sau durere cronica. Febră & care nu răspunde la alt tratament.	kalceks@kalceks.ro	+371 670 63210	NA	Kalceks Srl, str. 53, Reg. IV-1057, Letonia Tel: +371 670 63210 E-mail: kalceks@kalceks.lv	Mira Šourk