




Infarctul a trecut... cum să îl eviți pe al doilea!

Stături pentru pacienții care au suferit un sindrom coronarian acut



Primul an după infarct este cel mai important!

Infarctul a trecut... Asta înseamnă că ați depășit momentul dificil. E important să știți că există tratamente care, luate așa cum a recomandat medicul, vă măresc considerabil șansele de a trece mai ușor peste această perioadă grea și diminuează riscul de a face un alt doilea infarct.

După un infarct de care ați trecut cu bine, trebuie să știți că este important:

- Să mergeți la control la **medicul cardiolog**, așa cum v-a recomandat acesta;
- Să mergeți la **medicul de familie** periodic, pentru urmărirea evoluției bolii de inimă și pentru rojete lunare;
- **Să nu intrerupeți tratamentul** fără acordul medicului cardiolog. Întreruperea tratamentului vă va crește riscul de a suferi un alt eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau deces);



Ce este Sindromul Coronarian Acut?

Simptomele de la re șia viață mai ușoară reprezintă înțelegerea bolii.

Sindromul coronarian acut reprezintă un set de simptome determinate de blocarea completă (infarct miocardic) sau parțială (angină instabilă) a unui vas de sânge de la nivelul inimii.

Blocarea vaselor de sânge împiedică circulația acestuia și hrânirea țesutului înimii cu oxigen, astfel că zona inimii care a fost afectată nu se mai vindecă.



După infarct

După ce ați depășit evenimentul acut, trebuie să știți că îngustarea vaselor de sânge din cauza depunerilor de colesterol (ateroscleroza) este un proces care continuă și, în general, nu prezintă simptome.


De aceea, boala de inimă trebuie urmărită totă viață, deoarece, chiar dacă nu mai aveți simptomele din momentul producării infarctului, boala de inimă există, poate progresă și, în general, este nedurerioasă.

Este important să știți că persoanele care au suferit un infarct miocardic prezintă un risc crescut de a suferi un alt infarct, un accident vascular cerebral sau chiar deces.



S-a demonstrat că în primul an de la infarct riscul este cel mai mare, 20% dintre pacienți suferind un al doilea eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau chiar deces).

Riscul persistă și după primul an.



© Amberg S et al. Rev Rom Cardiol 2015; vol. 13, nr 2, numărul 2, anul II

Un al doilea infarct miocardic indică faptul că boala de inimă s-a agravat.


Stă în puterea dumneavoastră să vă scădeți riscul și să trăjiți o viață normală, dacă luți corect tratamentul recomandat de medicul cardiolog, mergeți cu regularitate la control și urmați un stil de viață activ și echilibrat.

Implantarea unui stent este doar o componentă a tratamentului pentru infarct miocardic

Implantarea unui stent, procedură care este numită **angioplastie**, ajută la restituirea circulației sângelui în vasul înfundat și la ameliorarea durerii în piept (angină pectorală).

Acest lucru **nu va vindeca** **îngustarea vaselor din inimă**, cauzată de depuneri de colesterol.

Fără un tratament adecvat și fără modificarea stilului dumneavoastră de viață pe termen lung, îngustarea vaselor poate progresă.



Tratamentul antiagregant plachetar

Probabil medicul cardiollog v-a recomandat multe medicamente după infarct, însă fiecare are un rol **bine definit și să ajută să revină la o stare normală și să prevenă** alte probleme de sănătate.

Pentru fiecare medicament este bine să respectați toate detaliile privind ministrarea: doza, perioada din zi când trebuie administrat, durată, acesta le-a indicat medicul cardiolog.

Dintre acestea, tratamentul cu inhiagregante plăcătare asociate cu acid acetilsalicilic (numite popular „medicamente pentru subierea săngelui”) are următoare beneficii.

- ⌚ Empiedică formarea sau creșterea cheagurilor de sânge în vasele înimi;
 - ⌚ Scade riscul de a suferi un eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau deces).

Durata tratamentului

Tratamentul cu antiagregante plăcătare și cu acid acetilsalicilic se recomandă pe o durată de minimum 12 luni.

Chiar dacă vă măriți bine după infarcție, este important să reiești sătul durată tratamentului recomandat de medicul cardiolog și să mergești lunar la vizită la medicul din familie pentru eliberarea retetei.



Posibile evenimente adverse asociate cu tratamentul antiagregant plachetar



Terapia cu antiagregante plachetare poate duce la apariția săngerărilor. **Dacă apar săngerări, nu vă speriați!** Anunțați imediat medicul cardiolog sau medicul de familie.

De asemenea, dacă aveți planificate intervenții chirurgicale, tratamente stomatologice, investigații radiologice sau endoscopice, anunțați personalul medical că urmați un tratament antiagregant plachetar.

Riscul întreruperii tratamentului

Întreruperea tratamentului antiagregant plachetar crește riscul de apariție a altui infarct, accident vascular cerebral sau deces. Un nou infarct poate fi fatal.

ACTIONAȚI! Luăți corect tratamentul prescris de medicul cardiolog, mergeți la controale și urmați un stil de viață sănătos.

ACTIONAȚI!

În primele 12 luni după infarct aveți riscul cel mai mare de a suferi un alt eveniment cardiovascular (infarct, AVC sau chiar deces). Riscul persistă și după un an, dar există soluții care să diminueze mult acest pericol.

- 1. Urmați tratamentul antiagregant plăchetat asa cum a fost recomandat de medicul cardiolog și mergeți cu regularitate la control.**
- 2. Mergeți periodic la medicul de familie pentru urmărire evoluției bolii și pentru rețeta lunară.**
- 3. Nu intrerupeți tratamentul fără acordul medicului cardiolog. Întreruperea crește riscul de a suferi un alt infarct, AVC sau deces.**
- 4. Urmați un stil de viață sănătos.**

