

*Înțelegem că în următoarele săptămâni, pacienții vor avea nevoie de suport și sprijin.*

**Înțelegem că trebuie să se întâlnească și să se cunoască!**

**Cum să îl eviți pe al doilea!**

Sfaturi pentru pacienții care au suferit un sindrom coronarian acut

**CNAŞ** AstraZeneca




## *Primul an după infarct este cel mai important!*

**Infarctul a trecut... Astă înseamnă că ați depășit momentul dificil.** E important să știți că există tratamente care, luate aşa cum a recomandat medicul, vă măresc considerabil şansele de a trece mai ușor peste această perioadă grea și diminuiază riscul de a face un alt doilea infarct.

După un infarct de care atunci trecut cu bine, trebuie să știți că este important:

- Să mergeți la control la **medicul cardolog**, așa cum v-a recomandat acesta;
- Să mergeți la **medicul de familie** periodic, pentru urmărea evoluției bolii de înaintă și pentru rețeta lunată;
- Să nu îtrerupeți **tratamentul** fără acordul medicului cardiolog. Înteruperea tratamentului vă va crește riscul de a suferi un alt eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau deces).




## **Ce este *Sindromul Coronarian Acut*?**

**Prințul pas către o viață mai ușoară îl reprezintă înțelegerea bolii**

**Sindromul coronarian acut** reprezintă un set de simptome determinate de blocarea completă (infarct miocardic) sau parțială (angină instabilă) a unui vas de sânge de la nivelul inimii.

**Blocarea vaselor de sânge** împiedică circulația acestuia și hrănirea țesutului inimii cu oxigen, astfel că zona inimii care a fost afectată nu se mai vindecă.



## După Infarct

**După ce ați depășit evenimentul acut, trebuie să știți că îngustarea vaselor de sânge din cauza depunerilor de colesterol (ateroscleroză) este un proces care continuă și, în general, nu prezintă simptome.**

De aceea, boala de înimă trebuie urmărīătoată viață, deoarece, chiar dacă nu mai aveți simptomele din momentul producerei infarctului, boala de înimă există, poate progresă și, în general, este neîncrezătoare.


**Este important să știți că persoanele care au suferit un infarct miocardic prezintă un risc crescut de a suferi un alt infarct, un accident vascular cerebral sau chiar deces.**



S-a demonstrat că în primul an de la infarct riscul este cel mai mare, 20% dintr-o pacient\* suferind un al doilea eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau chiar deces).

Riscul persistă și după primul an.

Un al doilea infarct miocardic indică faptul că boala de înimă s-a agravat. Stă în puterea dumneavoastră să vă scădeți riscul și să trăjiți o viață normală, dacă luati corect tratamentul recomandat de medicul cardiolog, mergeți cu regularitate la control și urmați un stil de viață activ și echilibrat.




*Implantarea unui stent este doar o componentă  
a tratamentului pentru infarct miocardic*

Implantarea unui stent, procedură care este numită **angioplastie**, ajută la reluarea circulației săngelui în vasul înfundat și la ameliorarea durerii în piept (angină pectorală).

Acest lucru nu va vindeca **îngustarea vaselor din înimă**, cauzată de depuneri de colesterol.

Fără un tratament adecvat și fără modificarea stilului dumneavoastră de viață pe termen lung, îngustarea vaselor poate progesa.



## *Tratamentul antiagregant plachetar*

Probabil medicul cardiolog v-a recomandat mai multe medicamente după infarct, însă fiecare are un rol bine definit și vă ajută să reveniți la o stare normală și să preveniți alte probleme de sănătate.

Pentru fiecare medicament este bine să respectați toate detaliile privind administrarea: **dоза, perioada din zi când trebuie administrat, durata - aşa cum vă le-a indicat medicul cardiolog.**

Dintre acestea, **tratamentul cu acid acetilsalicilic plachetare asociate cu acid acetilsalicilic (numite popular „medicamente pentru subțirea săngelui”) are următoarele beneficii:**

- ① Impiedică formarea sau creșterea cheagurilor de sânge în vasele întrimi;
- ② Scade riscul de a suferi un alt eveniment cardiovascular (infarct, accident vascular cerebral sau deces).

### **Durata tratamentului**

Tratamentul cu antiagregante plachetare asociate cu acid acetilsalicilic se recomandă pe o durată de **minim 12 luni\***.

**Chiar dacă vă simțiți bine după infarct, este important să respectați durata tratamentului recomandată de medicul cardiolog și să mergeți lunar la medicul de familie pentru eliberarea refetei.**



\* În unele cazuri, tratează cardio poate recomanda o durată mai scurtă de tratament.

## **Possible evenimente adverse asociate cu tratamentul antiagregant plachetar**


Terapia cu antiagregante plachetare poate duce la apariția săngerării. Dacă apar săngerări, nu vă sperlați! Anunțați imediat medicul cardiolog sau medicul de familie.

De asemenea, dacă aveți planificate intervenții chirurgicale, tratamente stomatologice, investigații radiologice sau endoscopice, arunțați personalul medical că urmați un tratament antiagregant plachetar.

### **Riscul întreruperii tratamentului**

Întreruperea tratamentului antiagregant plachetar crește riscul de apariție a altui infarct, accident vascular cerebral sau deces. Un nou infarct poate fi fatal.

**Aționați!** Luati correct tratamentul prescris de medicul cardolog, mergeți la controale și urmați un stil de viață sănătos.



## ACTIONAȚII

În primele 12 luni după infarct aveți riscul cel mai mare de a suferi un alt eveniment cardiovascular (infarct, AVC sau chiar deces). Riscul persistă și după un an, dar există soluții care să dărâneze mult acest pericol.

1. Urmați tratamentul antiagregant plachetar așa cum a fost recomandat de medicul cardiolog și mergeți cu regularitate la control.
2. Mergeți periodic la medicul de familie pentru urmărire evoluției bolii și pentru rețeta lunată.
3. Nu întrerupeți tratamentul fără acordul medicului cardiolog. Întreruperea crește riscul de a suferi un alt infarct, AVC sau deces.
4. Urmați un stil de viață sănătos.

