



*Înșolat pe foile*  
18.01.2016

# CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

**CABINET PREȘEDINTE**

Calou Căilișilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
Email: cabinet\_presedinte@casan.ro, Tel. 0372/309.270, Fax 0372/309.231

P 11506/16.01.2016

**Către,****Casa de Asigurări de Sănătate .....****În atenția,****Doamnelor/Domnului Președinte - Director General**

CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRĂ DE SĂNĂTATE TELEORMAN
Nr. înreg. 593
Data 15.01.2016

În conformitate cu adresa M.S. nr. 36587E/18.12.2015, înregistrată la C.N.A.S.  
– cu nr. P 11506/21.12.2015 vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția  
Europeană a Medicamentului (EMA), Agenția Națională a Medicamentului și a  
Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitor la  
*Informații noi importante referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atât femeilor,  
cât și barbatilor tratati cu Myfortic (acid micofenolic).*

Vă rugăm să luați măsuri de informare a furnizorilor de servicii medicale prin  
afișarea pe pagina electronică a casel de asigurări de sănătate, în loc vizibil, a  
documentului „*Myfortic (acid micofenolic): risc grav de teratogenie – Informații  
importante referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atât femeilor, cat și barbatilor.*”

Anexăm în fotocopie documentul respectiv.

Cu stimă,

**PREȘEDINTE**  
Dr. Vasile Ciurchea

Decembrie 2015

**Myfortic (acid micofenolic): risc grav de teratogenitate – informații noi importante referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atât femeilor, cât și bărbaților**

Stimate profesionist din domeniu sănătății,

De comun acord cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania Novartis, dorește să vă aducă la cunoștință recomandările consolidate privind prevenirea sarcinii pe durata utilizării micofenolatului de moftil (precursor al acidului micofenolic). Întrucât forma activă farmacologică a micofenolatului de moftil este acidul micofenolic, noile recomandări se aplică tuturor medicamentelor a căror substanță activă este acidul micofenolic. Medicamentul Myfortic al companiei Novartis conține acid micofenolic sub formă de micofenolat de sodiu.

**Rezumatul informațiilor privind siguranță**

Micofenolatul este un teratogen uman puternic, care, în cazul expunerii în timpul sarcinii, crește riscul de apariție a avortului spontan și a malformațiilor congenitale.

La punctul 4.3 al rezumatului caracteristicilor produsului s-au adăugat următoarele noi contraindicații:

- Micofenolatul nu se va administra în sarcină, cu excepția cazurilor în care nu este disponibil un alt tratament alternativ adecvat de prevenire a rejetului de transplant.
- Micofenolatul nu se va administra femeilor aflate în perioada fertilității și care nu utilizează metode de contracepție foarte eficace
- Pentru a exclude posibilitatea utilizării accidentale în timpul sarcinii, tratamentul cu micofenolat nu trebuie inițiat la femeile aflate în perioada fertilității care nu fac doar un test de sarcină cu rezultat negativ.

În plus:

- Medicul se vor asigura că femeile și bărbații care utilizează micofenolat înțeleag riscul de afectarea fătului, necesitarea utilizării unor metode contraceptive eficace și necesitatea de a consulta imediat un medic, în cazul în care există posibilitatea apariției unei sarcini.
- Se vor pune la dispoziție materiale educaționale pentru a prezenta în detaliu acestă risipă.

**Recomandări suplimentare privind testele de sarcină**

Înainte de începerea tratamentului cu Myfortic, pentru a exclude probabilitatea de expunere accidentală a embrionului la micofenolat, femeile aflate în perioada fertilității trebuie să efectueze un test de sarcină, recomandându-se realizarea a două teste de sarcină utilizând probe de urină sau ser, cu sensibilitate de minimum 25 mUI/ml; al doilea test trebuie efectuat la interval de 8 – 10 zile de la primul test și imediat înainte de începerea tratamentului cu Myfortic. Testele de sarcină trebuie repetate ori de câte ori este necesar din punct de vedere clinic (de exemplu, după raportarea unui decalaj în utilizarea contracepției). Rezultatele

tuturor testelor de sarcină trebuie discutate cu pacienta. Pacientele trebuie instruite să nu întrerupă tratamentul și, dacă rămân gravide, să se adreseze imediat medicului.

#### ***Recomandări privind contracepția adresate atât femeilor, cât și bărbaților***

Femeile aflate în perioada fertilității trebuie să utilizeze simultan două metode eficiente de contracepție, începând cu momentul întreruperii tratamentului cu Myfortic, în timpul acestuia, cât și timp de șase săptămâni după întreruperea tratamentului.

Bărbaților activi sexual (inclusiv celor vasectomizați) li se recomandă să folosească prezervative pe durata tratamentului și timp de cel puțin 90 de zile după întreruperea acestuia. În plus, partenerelor pacienților bărbați li se recomandă să utilizeze metode eficiente de contracepție, atât pe durata tratamentului, cât și timp de 90 de zile după ultima doză de Myfortic administrată pacientului bărbat.

#### ***Precauții suplimentare***

Pacienților li se interzice donarea de sânge în timpul tratamentului cu micofenolat și timp de cel puțin 6 săptămâni după întreruperea acestuia. Pacienții de sex masculin nu trebuie să doneze spermă în timpul tratamentului cu micofenolat, precum și timp de 90 de zile după întreruperea acestuia.

#### ***Informații suplimentare referitoare la prezența actualizare a datelor privind siguranța***

Recomandările de mai sus survin în urma unei evaluări cumulative a defectelor congenitale, care au confirmat că micofenolatul este un teratogen uman puternic și au prezentat dovezi ale existenței unui procent crescut de malformații congenitale și anormalități ierarhice asociate cu utilizarea micofenolatului în comparație cu alte medicamente.

- S-au raportat cazuri de avorturi spontane la 45% - 49% dintre femeile gravide expuse la micofenolat de mofetil, comparativ cu o rată de 12 - 33% raportată la pacienți cu transplant de organe solide și tratați cu alte imunosupresoare decât micofenolatul de mofetil.
- Pe baza raportărilor din literatura de specialitate, cazurile de malformații au apărut în cazul a 23% - 27% dintre nou-născuții VII al căror mame au fost expuse la micofenolat de mofetil în timpul sarcinii (comparativ cu 2% - 3% dintre nou-născuții VII din populația generală și cu 4% - 5% dintre nou-născuții VII al căror părinți cu transplant solid de organ au fost tratați cu alte imunosupresoare decât micofenolatul de mofetil).

Cel mai frecvent s-au raportat următoarele malformații (inclusiv malformații multiple):

- Anomalii ale urechii (de exemplu, anomalii de formare sau absență urechii externe/medii), atrezia canalului auditiv extern;
- Afecțiuni cardiace congenitale, precum defecte de sept atrial și ventricular;
- Malformații faciale, precum cleftoschizis, palatoschizis, micrognathie și hiperelorism orbital;
- Anomalii ale ochilor (de exemplu, colobom);
- Malformații ale degetelor (de exemplu, polidactilie, sindactilie);
- Malformații tracheo-esofagiene (de exemplu, atrezie esofagiană);
- Malformații ale sistemului nervos, precum spina bifida;
- Anomalii renale.

### ***Materiale educaționale***

Deținătorul autorizației de punere pe piață va transmite materiale educaționale specialistilor din domeniul sănătății. Acestea vor întări atenționările privind teratogenitatea micofenolatului, vor face recomandări privind contracepția înainte de începerea tratamentului, în timpul și după terapie și vor sublinia necesitatea efectuării testelor de sarcină. Medicul trebuie să furnizeze femeilor aflate în perioada fertilă și, după naștere, pacienților de sex masculin, informații complete adresate pacientului cu privire la riscul teratogen și măsurile de prevenire a sarcinii.

### ***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacții adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului Myfortic (acid micofenolic), către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul "Fișei pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente", disponibilă pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportarea de reacție adversă, trimisă către:

**Centrul Național de Farmacovigilență**  
**Str. Aviator Sărătescu nr. 48, Sector 1,**  
**011478 - București, România**  
**fax: +4 021 316 34 97**  
**tel: +4 0757 117 259**  
**e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)**

**Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact.**

**Novartis Pharma Services Romania S.R.L.**  
**Lakeview Office Building 301-311, B-dul Barbu Vacarescu, et. 1, sector 2, 020275,**  
**București Romania**  
**Telefon: 021 312 99 01**  
**Fax farmacovigilenta: 021 310 40 29 9**  
**E-mail: [drugsafety.romania@novartis.com](mailto:drugsafety.romania@novartis.com);**

***Coordonatele de contact ale reprezentanței locale ale Deținătorului de autorizație de punere pe piață***

Dacă aveți orice întrebări sau dorîți informații suplimentare privind administrarea medicamentului Myfortic, vă rugăm să contactați reprezentanța locală la următoarele date de contact:

**Dr. Alexandru Ionel**  
**Novartis Pharma Services Romania S.R.L.**  
**Lakeview Office Building 301-311, B-dul Barbu Vacarescu, et. 1, sector 2, 020275,**  
**București Romania**  
**Telefon: 021 312 99 01**  
**Fax 021 312 99 07**

E-mail: [alexandru.ionel@novartis.com](mailto:alexandru.ionel@novartis.com); [informatie.medicala@novartis.com](mailto:informatie.medicala@novartis.com)

Cu stimă,  
Dr. Alexandru Ionel,  
Director Științific & DRA