

Martie 2018

**Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății  
LYNPARZA (olaparib): riscul apariției erorilor de medicație asociate introducerii unei noi forme farmaceutice**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania AstraZeneca dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

**Rezumat**



- Forma farmaceutică de comprimate a produsului LYNPARZA (olaparib) a fost aprobată de Comisia Europeană în <data deciziei Comisiei UE>.
- Capsulele și comprimatele de LYNPARZA nu se pot înlocui între ele folosind raportul 1 milligram per 1 milligram din cauza diferențelor referitoare la doze și biodisponibilitate ale fiecărei forme farmaceutice.
- Pentru a evita erorile de medicație, medicii prescriptori trebuie să specifică forma farmaceutică și doza de LYNPARZA pe fiecare rețetă, iar farmaciștii trebuie să se asigure că pacienților li se eliberează corect forma farmaceutică și doza recomandată.
- Instruiți pacienții cu privire la doza corectă pe care trebuie să o ia pentru capsule sau comprimate. Pentru toși pacienții care trec de la capsule la comprimate (sau invers), explicați modul în care dozele în miligrame pentru cele două forme farmaceutice sunt diferite.

*Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță și recomandările respective* LYNPARZA (olaparib), forma farmaceutică de comprimate este indicată în monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat, neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.

LYNPARZA (olaparib), forma farmaceutică de capsule este indicată în monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinată și/sau somatică), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.

Modul de administrare pentru comprimate și capsule este diferit (a se vedea imaginea de mai jos) și cele două forme farmaceutice nu se pot înlocui între ele folosind raportul 1 milligram per 1 milligram; există un risc de supradozaj și de creștere a incidentelor adverse dacă

dosajă pentru capsule este utilizată pentru comprimate sau lipsă de eficacitate dină posologie  
pentru comprimate este utilizată pentru capsule.

Concentrația, forma farmaceutică și ambalajul*	Capsule 50 mg 	Comprimate 150 mg 	Comprimate 100 mg 
Doza recomandată	400 mg de două ori pe zi Dimineață      Seară 8 x                8 x  	300 mg de două ori pe zi Dimineață      Seară 2 x                2 x  	Utilizată numai pentru reducerea dozelui în tratamentul cu comprimate op 100
Ajustarea dozelui (de exemplu, în cazul apariției reaților adversi)	Reducerea dozelui se obține utilizând mai puține capsule de 50 mg  Scăderea inițială a dozelui: 200 mg (4 capsule de 50 mg) de două ori pe zi (doza zilnică totală: 400 mg)  Pentru scăderi suplimentare ale dozelui: 100 mg (2 capsule de 50 mg) de două ori pe zi (doza zilnică totală: 200 mg)	Reducerea dozelui se obține utilizând comprimatele de 100 mg (a se vedea coloana alăturată)	Reducerea inițială a dozelui: 250 mg (1 comprimat de 150 mg și 1 comprimat de 100 mg) de două ori pe zi (doza zilnică totală: 500 mg)  Pentru reduceri suplimentare ale dozelui: 200 mg (2 comprimate de 100 mg) de două ori pe zi (doza zilnică totală: 400 mg)

\* Imaginele formulărilor formelor farmaceutice sunt doar reprezentări și nu sunt la scară.

Rezumatul caracteristicilor produsului, prospectul și ambalajul celor două forme farmaceutice ale LYNPARZA includ informații despre faptul că cele două forme farmaceutice nu se pot înlocui între ele folosind raportul 1 miligram per 1 miligram.

▼ Aceast medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate.

#### *Apel la raportarea de reacții adverse*

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Lynparza, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secția Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: +4 021 317 11 02

Fax: +4 021 3 163 497

E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:  
**AstraZeneca Pharma S.R.L.**

Str. Menuetului, nr. 12, Bucharest Business Park

Corp D, etaj 1, 013713 București

Fax: +4 021 317 60 55

Tel: +4 0730 111 113

Email: [farmacoygilenta@astrazeneca.com](mailto:farmacoygilenta@astrazeneca.com)

#### *Coordonatele de contact ale reprezentanței locale a Deținătorului de autorizație de punere pe piață*

Pentru întrebări suplimentare referitoare la medicamentul Lynparza, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:  
**AstraZeneca Pharma S.R.L.**

Str. Menuetului, nr. 12, Bucharest Business Park

Corp D, etaj 1, 013713 București

Fax: +4 021 317 60 55

Tel: +4 0730 111 113

#### *Anexe*

<Secțiunile relevante din informațiile despre produs care au fost revizuite (cu modificările făcute vizibile) >